FARMACIA PERELLO

LABORATORIO FORMULACIÓN MAGISTRAL

Formulación Oftalmológica

farmacialaboratorioperello.es

FARMACIA PERELLO

Formulación Oftalmológica

CICLOSPORINA 0,05 - 0,1 % | Colirio - solución acuosa estéril csp. 10 ml

INDICACIONES	Ojo seco. Prevención de rechazo en trasplante de córnea. Síndrome de Cogan
CADUCIDAD	30 días en nevera
CONSERVACIÓN	Protegido de la luz y en nevera.

CICLOSPORINA 0,05 – 1 % | Colirio - solución acuosa estéril csp. 10 ml

INDICACIONES	Ojo seco. Prevención de rechazo en trasplante de córnea. Síndrome de Cogan. Síndrome de Sjögren (sequedad ocular)
CADUCIDAD	30 días en nevera
CONSERVACIÓN	Protegido de la luz y en nevera.

CICLOSPORINA 0,05 – 1 % | Pomada oftálmica estéril csp. 10 g

INDICACIONES	Ojo seco. Prevención de rechazo en trasplante corneal, queratoconjuntivitis seca.
CADUCIDAD	15 días
CONSERVACIÓN	Protegido de la luz , a temperatura ambiente

TACROLIMUS 0,03 % (3 mg) | Solución oleosa csp. 10 ml.

INDICACIONES	Profilaxis de rechazo en pacientes con trasplante de córnea de alto riesgo. Conjuntivitis alérgica severa en córnea y conjuntiva.
POSOLOGÍA	Una gota 2 veces al día en el ojo/s afectado. Pudiendo variar en función de la gravedad.
CADUCIDAD	15 días
CONSERVACIÓN	Protegido de luz y en nevera.

FARMACIA PERELLO

Formulación Oftalmológica

TACROLIMUS 0,02 % (2mg) | Pomada oftálmica csp 10g

INDICACIONES	Pénfigo, penfigoide cicatricial. Mayor penetración que ciclosporina
OBSERVACIONES	Controlar posible absorción sistèmica.

CEFUROXIMA 5 % | Solución acuosa estéril csp. 10 ml (Colirio Acuoso)

INDICACIONES	Profilaxis infecciosa en cirugía de cataratas, prevención de endoftalmitis
CONSERVACIÓN	Frigorífico
OBSERVACIONES	Alto riesgo. Controlar osmolaridad. Escasa inducción de resistencias.

AMIKACINA 2.5% - 5% | Solución Acuosa estéril csp. 10 ml (Colirio Acuoso)

INDICACIONES	Infecciones y úlceras corneales producidas por gérmenes gram-negativos. Se asocia con otros antibióticos.
CADUCIDAD	10 días
CONSERVACIÓN	Protegido de la luz y en nevera.

CEFTAZIDIMA 0,05 % | Solución estéril csp. 10 ml (Colirio Acuoso)

INDICACIONES	Cefalosporina de tercera generación, con especial actividad frente a Pseudomonas. Puede asociarse a otros antibióticos.
CADUCIDAD	15 días
CONSERVACIÓN	Protegido de luz y en nevera.

FARMACIA PERELLO

Formulación Oftalmológica

GENTAMICINA 8-10-13,6 mg | Solución acuosa estéril csp. 10 ml (Colirio Acuoso)

INDICACIONES	Infecciones o úlceras corneales ocasionadas por Gram negativos. (Klebsiella, Serratia, Pseud.) Puede asociarse a cefalosporinas o vancomicina
CADUCIDAD	30 días
CONSERVACIÓN	Nevera

CLINDAMICINA 5% | Solución acuosa estéril csp. 10 ml.

INDICACIONES	Infecciones oculares por anaerobios.
CADUCIDAD	24-48 horas
CONSERVACIÓN	Protegido luz y nevera

VANCOMICINA 3,1 % | Solución estéril csp. 10 ml

INDICACIONES	Infecciones oculares por Gram positivos(Staphyloccus, Streptococcus grupo A y Strep. Pneumoniae). También es frecuente asociarlo a aminoglucósidos.
CADUCIDAD	21 días
CONSERVACIÓN	Protegido de la luz y en nevera.

VORICONAZOL 1% (VFEND) | Solución estéril csp 10ml

INDICACIONES	Tratamiento de Aspergilosis oftálmicas
CADUCIDAD	21 dias
CONSERVACIÓN	Nevera, protegido de la luz

FARMACIA PERELLO

Formulación Oftalmológica

FLUCONAZOL 0,2 % | Solución acuosa estéril csp. 10 ml.

INDICACIONES	Antifúngico imidazólico con acción sobre Candida, Criptococus, etc. Tiene la ventaja frente a otros imidazólicos de ser hidrosoluble y dar fórmulas más estables.
CADUCIDAD	30 días
CONSERVACIÓN	Nevera

AMFOTERICINA 0,02 % | Solución acuosa csp. 10 ml.

INDICACIONES	Queratitis, úlceras y endoftalmitis fúngicas.
CADUCIDAD	17 días
CONSERVACIÓN	Protegido de luz y nevera.

CLORHEXIDINA digluconato 0,02 % | Solución acuosa estéril csp. 10 ml.

INDICACIONES	Queratitis por Acantomoeba
CADUCIDAD	3 días. 28 días
CONSERVACIÓN	Nevera protegido de la luz

POVIDONA YODADA 5 % | Solución acuosa estéril csp. 10 ml.

INDICACIONES	Preparación preoperatoria en cirugía ocular
CADUCIDAD	13 días
CONSERVACIÓN	Protegido de luz y nevera

FARMACIA PERELLO

Formulación Oftalmológica

CICLOPENTOLATO 0,5 % | Solución estèril csp 10ml

INDICACIONES	Iritis, queratitis, examen de refracción ocular y midriático en exploraciones diagnósticas
CADUCIDAD	1 mes (7 días a partir de la apertura)
OBSERVACIONES	Contraindicada en glaucoma de Angulo estrecho.

METILPREDNISOLONA SUCCINATO 1 % | Solución estèril csp 10ml

INDICACIONES	Keratoconjuntivitis seca grave
CADUCIDAD	7 dias
CONSERVACIÓN	Protegir de la luz y en frasco hermeticamente cerrado

CLORHEXIDINA digluconato 0,02 % | Solución acuosa estéril csp. 10 ml.

INDICACIONES	Queratitis por Acantomoeba
CADUCIDAD	3 días. 28 días
CONSERVACIÓN	Nevera protegido de la luz

MEDROXIPROGESTERONA 2 % | Solución estèril csp 10ml

INDICACIONES	Procesos inflamatorios del polo anterior del ojo. Conjuntivitis primaveral, alérgica aguda o crónica.

FARMACIA PERELLO

Formulación Oftalmológica

CLONIDINA ClH 5mg/ml | Solución acuosa estéril csp 10ml

INDICACIONES	Glaucoma, hipertensión post-operatoria o refractaria a otros tratamientos
POSOLOGÍA	1 gota / 3-4 veces al día bajo vigilancia clínica y monitorización.
CADUCIDAD	28 días
CONSERVACIÓN	Temperatura ambiente no superior a 25ºC
OBSERVACIONES	Contradindicado en patologia cardiovascular, controlar efectos secundarios (hipotensión, bradicàrdia,sedación,

FENILEFRINA 1-2,5 % | Solución estèril csp 10ml

INDICACIONES	Midriatico y vasoconstrictor, al 1% para el diagnostico diferencial síndrome de Horner
CADUCIDAD	7 dias
CONSERVACIÓN	Nevera

PILOCARPINA 0,125 % | Solución estéril csp 10ml

INDICACIONES	Miótico, constricción de la pupila. Utilizado en el tratamiento de la pupila de ADIE. A dosis mayores, primera elección en glaucoma de angulo abierto, reduce la tensión ocular
CADUCIDAD	1 semana
CONSERVACIÓN	Nevera

FARMACIA PERELLO

Formulación Oftalmológica

ATROPINA 0,01 % | Solución acuosa estéril csp 10ml

INDICACIONES	Tratamiento de la miopía infantil. A dosis mayores (0,5% - 2%) se usa para el tratamiento de la uveítis, iritis y como midriático y cicloplejico, aplicado en exámenes de refracción ocular
CADUCIDAD	15 días
CONSERVACIÓN	Nevera

MITOMICINA-C 0,02-0,04 % | Solución estéril 10ml

INDICACIONES	Antimitótico. Papiloma caruncular, neoplasias conjuntivales y prevención Pterigium recurrente después de escisión quirúrgica.
CADUCIDAD	7 días
CONSERVACIÓN	Temperatura ambiente, nunca en nevera

EDTA 0,7 % | Solución estèril csp 10ml

INDICACIONES	Opacidades calcificades de la córnea y quemaduras por cal
CADUCIDAD	7 días
CONSERVACIÓN	Temperatura ambiente

FARMACIA PERELLO

Formulación Oftalmológica

SODIO CLORURO 2 % | Solución estéril csp 10ml

INDICACIONES	Edema corneal
CADUCIDAD	7 dias
CONSERVACIÓN	Nevera
OBSERVACIONES	Puede ocasionar sensación de picor en el ojo

ACETILCISTEINA (10-15-20 %) | Solución estéril csp. 5 ml

INDICACIONES	Cicatrización en quemadura por álcalis. Queratoconjuntivitis seca
POSOLOGÍA	1 gota / hora (trat. agudo) 1 gota / 6 horas (mant.)
CADUCIDAD	96 horas
CONSERVACIÓN	Protegido de la luz y en nevera.
OBSERVACIONES	Incompatible con numerosos antibióticos

CISTEAMINA 0,1 - 0,2 - 0,3 % | Solución estéril csp 10ml

INDICACIONES	Cistinosis, produce fotofobia por acumulación de cristales de cistina. La cisteamina la convierte en forma soluble, cisteína.
CADUCIDAD	1 mes
CONSERVACIÓN	Nevera

VERDE BRILLANTE 0,5 % | Solución acuosa estéril csp. 10 ml

INDICACIONES	Colorante utilizado para lesiones corneales, úlceras , etc. también en el caso de queratonconjuntivitis seca.

FARMACIA PERELLO

Formulación Oftalmológica

IVERMECTINA 1 % | Pomada oftálmica csp 10g

INDICACIONES | Blefaritis y caída de las pestañas debido a Demodex foliculorum.

OBSERVACIONES | También se puede tratar con ivermectina vía sistémica.

METRONIDAZOL 0,5 % | Solución estéril csp 10ml

INDICACIONES | Rosácea ocular. Blefaritis y caída de las pestañas.

METRONIDAZOL 0,7 % HIDROCORTISONA 1 % | Pomada oftálmica csp 10g

INDICACIONES | Rosácea ocular. Blefaritis y caída de las pestañas.

FARMACIA PERELLO

LABORATORIO FORMULACIÓN MAGISTRAL

Farmacia Laboratorio Perelló
C/ Virgen de los Desamparados 6
46869 Atzeneta de Albaida (Valencia)

962356132
farmacialaboratorioperello.es
info@farmacialaboratorioperello.es